

Sortie du 10 juin 2012

Marais du Hommet

Le HOMMET D'ARTHENAY

Météo très défavorable. Humidité et pluie.

7 participants

Le marais est constitué de prairies inondables délimitées par des canaux appelés « limes ».

Cet espace naturel doit son équilibre à de nombreuses activités traditionnelles comme le pâturage, la fauche et le curage des canaux.

Mais comme nous avons pu observer, à certains endroits, ces activités ont cessé, le milieu ouvert a tendance à se fermer : la pousse des roseaux (phragmites.....) et des saules... n'est plus limitée.

Nous pouvons ainsi observer de nouvelles espèces d'oiseaux.

Liste des espèces observées

La météo humide n'a pas permis une observation aisée des oiseaux fréquentant cette zone humide : malgré cela, 32 espèces ont finalement été dénombrées, allant à la fois espèces bocagères et espèces plus spécifiques des zones humides.

Les **sylviidés** (fauvettes, hypolaïs, etc) ont été particulièrement remarqués et ont bien marqué la différence entre bocage et marais. La préservation des zones humides, avec une gestion concertée de l'eau et des espaces reste toujours d'actualité et une nécessité pour la biodiversité.



Mare de gabion

Pinson des arbres	Plusieurs chanteurs surtout en bordure de marais mais aussi dans les saules qui bordent le chemin.
-------------------	--

Troglodyte mignon	Un chanteur se manifeste du côté du marais.
Grive musicienne	Un chant hésitant d'un individu perché sur un chêne.
Geai	Deux à trois individus passent d'une haie à l'autre côté est du chemin.
Hirondelle de cheminée	Plusieurs chassent au-dessus des prairies de fauche.
Martinet noir	Les insectes sont plaqués au sol, les martinets chassent très bas. Ils nichent dans les villages environnants.
Fauvette à tête noire	4 à 5 chanteurs : les secteurs boisés avec un couvert végétal important (ronciers par exemple) attirent cette fauvette.
Fauvette grisettes	Transport de nourriture pour deux individus dans une prairie qui n'est plus exploitée. Va et vient incessant de cette migratrice qui apprécie les endroits découverts avec buissons, les friches herbeuses avec arbustes ou épineux (pruneliers, aubépines)
Hypolaïs polyglotte	Un chant et une apparition très furtive de ce passereau migrateur au chant varié qui se fait entendre dans les haies buissonnantes des terrains secs. Remarqué à son dessous plutôt jaune.
Pouillot véloce	Quelques chanteurs notamment dans les saules qui colonisent la prairie de fauche à l'abandon.
Buse variable	Le temps humide n'empêche pas la buse de planer haut dans le ciel

Busard des roseaux	Le busard mâle prend lui aussi un peu d'altitude avec son vol chaloupé : il niche dans le marais dans les roselières ou les prairies de fauche. Un autre busard fréquente le marais : le busard cendré.
Coucou gris	Entendu à deux reprises.
Poule d'eau	Un cri dans le réseau de fossés humides et de petites mares du marais.
Bouvreuil pivoine	2 individus passent des saules au couvert de la haie sur talus.
Verdier d'Europe	2 décollent des saules qui colonisent la prairie en friche.
Linotte mélodieuse	Deux individus sont observés dans la partie la plus découverte et humide du marais. La linotte aime les lieux découverts et plutôt secs.
Chardonneret élégant	Plusieurs individus qui trouvent une nourriture facile dans les prairies de fauche et les friches herbeuses.
Bruant des roseaux	Plusieurs mâles font entendre leur chant bref et hésitant, perchés sur des saules ou sur de l'oseille sauvage (doche)
Bergeronnette flavéole (flavissima)	Un individu nous fait admirer sa magnifique livrée jaune vif, (deux espèces distinctes nichent en Normandie, la flavissima et la flava) devant le gabion.
Phragmite des joncs	Le réseau de fossés humides avec sa végétation touffue abrite de nombreux couples de cet oiseau reconnaissable à son sourcil blanc sale et son dos rayé. Nous découvrons deux individus qui transportent de la nourriture et nourrissent au fond d'un fossé.
Rousserolle effarvate	Une rousserolle fait entendre son chant rythmé et plein d'imitations, un individu apparaît et se faufile dans les roseaux. La rousserolle est plutôt claire en dessous et le dos est brun uniforme. Elle apprécie les zones humides .

Bouscarle de Cetti	Elle fait entendre son chant puissant et assez bref d'un saule ou d'un fouillis végétal près de l'eau. Elle est sédentaire et peut être victime d'hivers très froids.
Cisticole des joncs	Deux individus au moins émettent leur chant tsic tsic tsic dans leur vol ondulé au-dessus de la prairie de fauche. Ce petit oiseau méridional très prolifique niche dans les herbes . Il est lui aussi victime des coups de froid hivernaux.

Mésange charbonnière	Fréquente volontiers les saules et les zones plus humides
Mésange bleue	Un cri entendu dans les saules qui bordent le chemin
Etourneau sansonnet	Des jeunes au sol sur des prés fauchés.
Pigeon ramier	Chante et circule en bordure de marais.
Moineau domestique	La présence de haies monospécifiques et de quelques volailles à la maison du marais explique son observation.
Merle noir	Fréquente la lisière bocage-marais mais et est beaucoup moins présent dans le marais lui-même.
Accenteur mouchet	Un chanteur entre la maison des marais et le chemin.
Goéland argenté	Plusieurs en vol vers le sud viennent peut-être du centre

	d'enfouissement des déchets de Saint-Fromond
Corneille noire	Présente partout
Fauvette babillarde	Entendue très brièvement, observée deux jours avant dans le même secteur , un peu le même milieu que la grisette mais plus dense.



Prunelliers en fleur le long du chemin qui traverse le marais du nord au sud.



Les saules colonisent les prairies de fauche non entretenues